

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

**ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"** (Tél. 87-18-28 - 87-18-29)  
(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, INDRE-ET-LOIRE, EURE-ET-LOIR)

*Sous-Régie de la Protection des Végétaux, 93, rue de Curambourg, 45-FLEURY-LES-AUBRAIS*

C. C. P. : La Source 4.604-25

**ABONNEMENT ANNUEL**  
**25 Francs**

DLP 17-8-72 412452

Supplément n° 1 au Bulletin n° 143

8 AOUT 1972

- 29 -

## VERS DE LA GRAPPE

## VIGNES

Les vols d'Eudémis et de Cochylis se poursuivent. Les pontes, localement nombreuses, déposées durant les derniers jours du mois de Juillet, commencent à éclore.

En conséquence, il est conseillé d'effectuer un traitement dès réception de ce bulletin. Ce traitement est nécessaire dans les vignes habituellement infestées par ces ravageurs et notamment dans celles où des dégâts ont été observés au cours de l'évolution de la première génération.

Etant donné l'échelonnement de ce deuxième vol il est possible qu'une autre intervention soit justifiée ultérieurement.

## MILDIOU DE LA VIGNE

Les pluies orageuses de la fin du mois de juillet ont été à l'origine de quelques contaminations visibles maintenant sur les feuilles.

Il y a donc lieu de tenir compte des indications données dans notre bulletin du 31 Juillet.

## CULTURES LEGUMIERES

### BLACK-ROOT SUR HARICOT

Des dégâts sévères aboutissant le plus souvent à la perte totale de la récolte ont été observés dans plusieurs champs de haricots au Sud-Ouest d'Orléans. Ils se caractérisent par des nécroses brunes le long des ramifications, le dessèchement des gousses ainsi que des nécroses jaunâtres sur feuilles avec brunissement des nervures. Il s'agit d'une réaction au virus 1 du haricot. Ce virus provoque habituellement sur les variétés sensibles la Mosaïque commune du haricot ; mais, sur les variétés normalement résistantes (Michelet, Processor, etc...) on peut observer les dégâts cités plus haut (Black-root) si la température est voisine de 30° et si des pucerons vecteurs de virus se trouvent dans le champ.

Nous signalons que ces dégâts auraient probablement pu être évités par des traitements réguliers contre les Pucerons.

## TABAC

### MILDIOU DU TABAC

Un nouveau foyer de Mildiou a été observé à CROUY-SUR-COSSON (Loir-et-Cher) par le Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes (S.E.I.T.A.). Il s'agit d'une attaque ancienne non virulente sur feuilles basses (taches nécrosées).

Nous rappelons que les producteurs de tabac doivent appliquer les recommandations du S.E.I.T.A. et tenir compte des instructions contenues dans l'arrêté préfectoral rendant obligatoire la lutte contre le Mildiou du tabac.

Les Ingénieurs chargés des Avertissements  
Agricoles,

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,  
Chef de la Circonscription phytosanitaire  
"CENTRE"

G. RIBAUT  
B. PACQUETEAU

G. BENAS